

Riktlinjer vid ett första fall av *Mycoplasma bovis* mastit

Direkt åtgärd

Sektionera och slakta kor med klinisk mastit orsakad av *M. bovis*
Undersök, sektionera och slakta kor med *M. bovis* i JHKL 6-9
PCR-screening av övriga kor för *M. bovis* skall alltid övervägas

Förebyggande för att inte få fler fall

Högsta möjliga nivå på hygien och smittskydd kring kalvning
Endast råmjölk från första urmjölknigen för direktutfodring
Pastörisering av all övrig helmjök till kalvar
Förbättra smittskydd generellt i övrigt
Spendopp med jod, riklig tillförsel, kolla ev. munstycken varje vecka

Speciellt för mjölkningmomentet

Kontrollera mjölkningsrutiner, maskinfunktion och robotinställningar

- Mjölka med handskar i konventionell mjölkning
- Daglig rengöring av borstar och tvättopp (Lely och DeLaval VMS)

Övervakning och analys

PCR på tankmjölk varje månad kvartal 1, därefter varje kvartal
PCR på kor som haft mastit sista 1-2 månaderna
PCR på alla mastiter under kommande 2 månader
PCR på nykalvade kor under kommande 6 mån
Följ tankmjölksceltal kontinuerligt via kokontrollen

Hede 2016-02-18

Veterinär Håkan Landin
Expert Juverhälsa och Djurvälstånd

